



OBSTRUCCIÓN PARCIAL EN NIÑOS

La obstrucción parcial en niños se caracteriza por que los niños son capaces de inhalar y exhalar aire, además, de que el niño puede toser fuertemente.


Generalmente, en este caso, el motivo de obstrucción es la comida, suceso conocido popularmente como atragantamiento y que puede ocurrir en las horas de descanso de las escuelas.

Los signos de obstrucción parcial son:

- Tos fuerte
- Desesperación
- Imposibilidad de hablar adecuadamente
- Respiración ruidosa

Las recomendaciones en caso de estar ante una situación de ahogamiento parcial son:

- Dejarlo toser (los mecanismos de defensa funcionan)
- Observar que siga tosiendo o que expulse el cuerpo extraño
- No golpear nunca la espalda, ya que se podría producir la obstrucción completa o introducirse más el cuerpo extraño
- Animar al paciente a toser y no interferir en la tos y respiración espontánea del paciente
- Intentar identificar al cuerpo extraño (preguntar a testigos)
- Revaluar continuamente al paciente por si muestra signos de empeoramiento o desobstrucción



Referencia:

Caminos Culturales. (2022). boy with fluor. [Imagen]. caminosculturales. <https://www.caminosculturales.com.ar/wp-content/uploads/2022/08/Ill-boy-with-flu-or-cold-flat-vector-illustrations-set-Convertido.png>

Moliné Marco, J. L. (1999). Obstrucción de las vías respiratorias: primeros auxilios. Ministerio de trabajo y asuntos sociales. https://www.insst.es/documents/94886/326962/ntp_467.pdf/a74241b9-d2a5-4f3b-a3fa-bb45259cba2e