




# ¿SABÍAS QUÉ?

De 1999 a 2017 fallecieron 100.834 personas por algún tipo de asfixia, con un promedio de 5307 defunciones por año. Los ahogamientos constituyeron el 44,66% del total de las asfixias y afectan principalmente a varones (77,18% del total de las defunciones). Por grupo de edad, la población infantil representó el 30,80% del total de defunciones, aunque la mayor parte de ellas se concentró en el grupo de menores de 1 año (17,77%).



Los ahogamientos afectan a población infantil y adolescente, ocurren con más frecuencia en abril, julio y agosto, los domingos, y en horario vespertino; las otras asfixias afectan a población infantil y adulta mayor, ocurren con más frecuencia de diciembre a febrero, en domingo, de las 4 a las 6 h. Según la ENSANUT-2012, 53.065 personas sufren una asfixia no fatal al año, el 26,21% con consecuencias permanentes en su salud. Se observaron riesgos importantes de asfixia en el 38% de las guarderías y el 80% de los hogares analizados.

Referencia:

Pérez-Núñez, R., & Vera-López, J. D. (2020). Las asfixias accidentales en México: un problema de salud pública oculto. *Science Direct*. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213911119301463>

Dra. Herraiz. (2013). ahogo. [Imagen]. Dra. Herraiz: Médico y paciente. <https://draherraizmedicoypaciente.files.wordpress.com/2013/12/ahogo.png>